遗失

遗失报废机动车回 收证明,牌照皖 MZH066, 车 主: 许 宏 裕。 回收证明编码: HS-340000-10110056-20241015-137, 特此声

遗失安徽省滁州市 全椒县十字镇百子村圣 坂村民组开户许可证,

J3754001251201,账号 04010230000002718,编 号:3610-02275722,声

明作废。



产后大出血如何预防、急救与产后护理

产后大出血(PPH)是产妇在分娩后 的头24小时内,或在产后6周内发生的严 重并发症,具有极高的致死风险。每一位 准妈妈在分娩之前,都应了解产后大出血 的风险、成因及如何进行自救与护理,这 对于产妇和新生儿的健康至关重要。

什么是产后大出血?

产后大出血通常指产妇在分娩后失 血量超过500毫升,超过1000毫升则被视 为严重。它是全球孕产妇死亡的主要原 因之一,尤其在医疗条件有限的地区,风 险更高。虽然多数产妇不会遇到严重大 出血,但了解其定义和危害,可以帮助我 们在关键时刻迅速做出正确反应,降低风 险,确保母婴安全。

产后大出血的主要原因

1. 子宫收缩乏力:这是产后大出血 最常见的原因。如果子宫不能有效收缩, 这些血管就会持续出血,从而导致大量出 血。子宫收缩乏力的原因可能包括产妇 的多胎妊娠、羊水过多、子宫过度扩张等。

2.软产道损伤:在分娩中,尤其是困 难分娩或胎儿较大时,产妇的阴道、宫颈 或会阴部可能撕裂或受损。这种情况多 见于快速分娩或使用产钳、真空吸引等辅 助分娩方式。如果这些损伤未及时修复, 可能导致严重出血。

3. 胎盘原因:胎盘在分娩后应完全 排出,但有时部分组织可能滞留在子宫 内,妨碍子宫收缩,导致持续出血。此外, 胎盘异常附着或粘连(如前置胎盘或胎盘 植人)也可能导致其无法正常分离,引发 大出血。

4. 凝血功能障碍:某些产妇可能患 有先天性或后天性的凝血功能障碍,导致 血液无法正常凝固。

产后大出血的预防措施

1. 产前检查:定期的产前检查对于 发现潜在的风险因素至关重要。通过超 声波等检查手段,提前发现可能导致产后 大出血的因素,如胎儿过大、胎盘位置异 常等。对高风险孕妇,医生可能会建议提 前住院待产,以便在紧急情况下能够快速 反应。

2. 分娩管理:无论是自然分娩还是 剖宫产,医生都会在分娩时密切注意子宫 的收缩情况,确保在胎盘娩出后,子宫能

【健康科普】

够迅速收缩。对于可能需要器械辅助分 娩的情况,医生也会尽量谨慎,以避免不 必要的产道损伤。

3. 按摩子宫:分娩后,助产士通常会 在第一时间进行子宫按摩,促进子宫收 缩,减少出血。子宫按摩的过程可能会让 产妇感到不适或疼痛,但这是一个非常有 效的预防措施。产妇在分娩后数小时内 也可以在医生指导下自行进行轻柔的子 宫按摩,以帮助子宫恢复。

4.药物及时应用:对于有产后大出血 风险的产妇,医生在分娩后根据病情评估 立即使用促进子宫收缩的药物,这些药物 可以显著降低出血的风险。

关键时刻如何自救与护理

1. 保持冷静,立即呼救:第一时间应 保持冷静,并迅速拨打急救电话。告知医 护人员出血的严重程度和产妇的其他症 状(如头晕、乏力),以便他们能够快速做

2. 卧床休息,抬高双腿:让产妇平 躺,并将双腿抬高。这种姿势有助于增加 静脉回流,维持血压,防止休克的发生。 同时,产妇应尽量卧床休息,等待救护医 务人员到了,减少出血。

3. 按压下腹部:在医护人员到达前, 可以尝试用手轻压产妇的下腹部,帮助 子宫收缩。具体方法是用双手按压子宫 底部的部位,进行持续且适度的按摩。 这一操作可以在一定程度上减缓出血, 但应注意力度和频率,避免过度用力导 致其他损伤。

产后大出血后的护理与恢复

产后大出血的产妇通常需在医院密 切监测24至48小时,观察子宫收缩、出血 量和生命体征,防止延迟性出血。为了 恢复,产妇应补充富含铁的食物或使用 铁剂改善贫血。同时,产妇可能面临情 绪波动,家人和医护人员应提供支持,必 要时寻求心理帮助。42天后需复查子宫 恢复和整体健康状况,遵医嘱进行康复, 避免剧烈运动,保持良好作息。

产后大出血是一个严重且不可忽 视的健康问题,但通过科学的预防、及 时的自救与合理的护理,可以有效降低 其风险,保障母婴安全。希望本文能为 广大准妈妈和新手妈妈提供实用的知 识与指导,让每一位母亲都能平安顺利 地度过产后这一重要阶段。

(滁州市中西医结合医院 刘玲)

